



# FOX FORMULATE

## เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวแบบมืออาชีพ



สารชนิดดูดซึม 48% เติบโตทันท่วงทีทุกบาท ดูดซึมเร็ว ทนน้ำตายนาน



บริษัท ฟ็อกซ์ ฟอรัลเลท จำกัด โทร. 0-2978-6922, 0-2978-6923  
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ



# เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวแบบมืออาชีพ

ทุกอัตราที่แนะนำผสมน้ำ 1 หม้อเครื่อง ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ 2 งาน

ข้าวอายุ 0-4 วัน



ฉีดยาก่อนวันหว่าน



**ทาลูท 60**  
120 ซีซี.

คุมหญ้าได้ทั้งใบแคบ  
และใบกว้าง



ข้าวไม่แดง หน่อไม่หงิก

ข้าวอายุ 7-12 วัน



การป้องกันกำจัดวัชพืช

คุม-ฆ่าหญ้าข้างนาก หญ้าดอกขาว  
หนวดปลาชุก กกต่างๆ  
ข้าวไม่แดง ไม่จัน



**คองคาร์ต 55**  
150 ซีซี.      **มิกซ์อิน 1**  
1 ๕๐๐



**คองคาร์ต 70**  
120 ซีซี.      **มิกซ์อิน 1**  
1 ๕๐๐

ข้าวอายุ 15-20 วัน



กำจัดวัชพืชในกว้างและนาก



**มิกซ์อิน 2-3**  
๒-3 ๒๐๐

- เกียนนา
- พักปอดนา
- แควทุม
- หญ้าดอกขาว
- หนวดปลาชุก
- กกต่างๆ
- พักแฉ่น
- หญ้าข้างนาก

ระยะข้าวแตกกอ



กำจัดหนอนกอ



**เออร์ลี 40**      **เออร์ลี 55**  
30 ซีซี.              20 ซีซี.

กำจัดหนอนม้วนใบข้าว



**อาร์น่า**  
30 ซีซี.

ระยะตั้งท้อง-โพลีเพล



กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



**เบนาร์ต**      **ฟ็อกซ์พรีน 25**  
30 ซีซี.              20 กรัม

ป้องกันกำจัดโรคมดแดงและใบจุด



**โอมมี**  
30 ซีซี.

ระยะนํ้านม



กำจัดแมลงนํ้านม แมลงสีง



**เซโลกัน**      **เดลล์**  
20 ซีซี.              20 ซีซี.

ป้องกันกำจัดโรคมดแดงและใบจุด



**โอมมี**  
30 ซีซี.



## บิกเกอร์ไรซ์ สูตร 1

เร่งแตกกอ ใบเขียวเข้ม ต้นแข็ง ใบตั้ง ต้านทานโรค และแมลง  
ใช้ บิกเกอร์ไรซ์ สูตร 1 อัตรา 30 ซีซี.

\*ฉีดพ่น 2 ครั้ง 1. ช่วงอายุ 15-20 วัน 2. ระยะข้าวแตกกอ



## บิกเกอร์ไรซ์ สูตร 2

รวงยาวใหญ่ เมล็ดเต่งใส ออกรวงเร็ว เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น  
ใช้ บิกเกอร์ไรซ์ สูตร 2 อัตรา 30 ซีซี.

\*ฉีดพ่น 2 ครั้ง 1. ระยะตั้งท้อง-โพลีเพล 2. ระยะนํ้านม

# ผลิตภัณฑ์คุณภาพ.....ตรา ฟ็อกซ์



หนอนกระทู้  
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
หอยโข่ง  
หนอนข้าว



**คลาส 36 + ทาเลนท์ 60**  
ใช้คุม-ฆ่าหญ้าทั้งใบแคบ และใบกว้างในนาข้าว  
หลังจวนข้าว 7-15 วัน  
ใช้อัตรา 1 ชุด ต่อไร่ 200 ลิตร



เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



**คานี**  
หัวยานีออคทอน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
สูตรฉีดช่วงดอกได้  
ใช้อัตรา 10-15 ซีซี. ต่อไร่ 20 ลิตร



หนอนข้าว



**เซนกาโก้**  
สารดูดซึมออกฤทธิ์ 3 ทาง  
กินตาย ถูกตาย และไอระเหย  
ใช้อัตรา 30 ซีซี. ต่อไร่ 20 ลิตร

## การป้องกันกำจัดโรคข้าว อย่างมีประสิทธิภาพ เมล็ดสวย ใบสะอาด



**ไอทามิ**  
อัตราใช้ 30 ซีซี.

หรือ



**เลวิน เอฟ**  
อัตราใช้ 20 ซีซี.



**ซินนอน**  
อัตราใช้ 20 ซีซี.



ผสมน้ำ  
1 หม้อเครื่อง  
พ่นให้ทั่ว  
พื้นที่ 2 งาน

ควรฉีดพ่น 2 ครั้ง

1. เมื่อข้าวตั้งท้อง (อายุ 65-70 วัน)
2. เมื่อข้าวเริ่มออกรวง (อายุ 75-80 วัน)



โรคใบด่างข้าว



โรคใบจุดสีน้ำตาล



โรคไหม้ใบธง



โรคไหม้คอรวง



โรคดอกกระพี้



โรคใบด่างสีน้ำตาล



**เต็มควียน**  
เร่งเต่ง ออกรวงสม่ำเสมอ  
ใช้อัตรา 30 กรัม  
ต่อไร่ 20 ลิตร  
\* ฉีดพ่น 2 ครั้ง  
1. ระยะตั้งท้อง-โผล่พล่ 2. ระยะนํ้านม



**โครซิงค์**  
ทนหนาว ทนแล้ง  
แก้ปัญหาคข้าวต้นเหลือง  
ราคาต่ำ ไม่กินปุ๋ย  
ใช้อัตรา 20 ซีซี. ต่อไร่ 20 ลิตร



บริษัท ฟ็อกซ์ ฟอรัลเลท จำกัด

827 หมู่ 12 ต.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0-2978-6922 แฟกซ์. 0-2978-6928