



FOX FORMULATE

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวแบบมืออาชีพ



สารชนิดดูดซึม 48% เติบโตทันท่วงทีทุกบาท ดูดซึมเร็ว ทนน้ำตายนาน



บริษัท ฟ็อกซ์ ฟอรัลยูเลท จำกัด โทร. 0-2978-6922, 0-2978-6923
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวแบบมืออาชีพ

ทุกอัตราที่แนะนำผสมน้ำ 1 หม้อหรือเครื่อง ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ 2 งาน

ข้าวอายุ 0-4 วัน



ฉีดยาก่อนวัชพืชงอก



ทาลาท 60
120 ซีซี.
คุมหญ้าได้ทั้งใบแคบ
และใบกว้าง

สูตรพิเศษ
ข้าวไม่แดง หน่อไม่หัก

ข้าวอายุ 7-12 วัน



การป้องกันกำจัดวัชพืช

คุม-ฆ่าหญ้าข้างนาก หญ้าดอกขาว
หนวดปลาชุก กกต่างๆ

สูตรพิเศษ
ข้าวไม่แดง ไม่จัน



คอนกราด 55 150 ซีซี. **มิทซ์อิน** 1 ๕๐๐

หรือ

คอนกราด 70 120 ซีซี. **มิทซ์อิน** 1 ๕๐๐

ข้าวอายุ 15-20 วัน



กำจัดวัชพืชใบกว้างและกก



มิทซ์อิน
2-3 ซอง

- เกียนนา
- พักปอดนา
- แควทุม
- หญ้าดอกขาว
- หนวดปลาชุก
- กกต่างๆ
- พักแฉ่น
- หญ้าข้างนาก

ระยะข้าวแตกกอ



กำจัดหนอนกอ



เออร์ลี 40 30 ซีซี. **เออร์ลี 55** 20 ซีซี.

กำจัดหนอนม้วนใบข้าว



อารีน่า
30 ซีซี.

ระยะตั้งท้อง-โพลีเพล



กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



เบนาร์ต 30 ซีซี. **ฟ็อกซ์ฟอน 25** 20 กรัม

ป้องกันกำจัดโรคมืดต้นและใบจุด



โอมิม
30 ซีซี.

ระยะนํ้าม



กำจัดแมลงนํ้าม แมลงสีง



เชลกัน 20 ซีซี. **เดลล์** 20 ซีซี.

ป้องกันกำจัดโรคมืดต้นและใบจุด



โอมิม
30 ซีซี.

บิกเกอร์ไรซ์ สูตร 1



เร่งแตกกอ ใบเขียวเข้ม ต้นแข็ง ใบตั้ง ต้านทานโรค และแมลง
ใช้ บิกเกอร์ไรซ์ สูตร 1 อัตรา 30 ซีซี.

*ฉีดพ่น 2 ครั้ง 1. ช่วงอายุ 15-20 วัน 2. ระยะข้าวแตกกอ

บิกเกอร์ไรซ์ สูตร 2



รวงยาวใหญ่ เมล็ดเต่งใส ออกรวงเร็ว เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น
ใช้ บิกเกอร์ไรซ์ สูตร 2 อัตรา 30 ซีซี.

*ฉีดพ่น 2 ครั้ง 1. ระยะตั้งท้อง-โพลีเพล 2. ระยะนํ้าม

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ.....ตรา ฟ็อกซ์



หนอนกระทู้
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
หอยโข่ง
กบดาน



คลาส 36 + ทาเลนท์ 60
ใช้คุม-ฆ่าหญ้าทั้งใบแคบ และใบกว้างในนาข้าว
หลังจวนข้าว 7-15 วัน
ใช้อัตรา 1 ชุด ต่อไร่ 200 ลิตร



เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



คานี
หัวยานีออคทอน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สูตรฉีดช่วงดอกได้
ใช้อัตรา 10-15 ซีซี. ต่อไร่ 20 ลิตร



หนอนผีเสื้อในข้าว



เซนกาโก้
สารดูดซึมออกฤทธิ์ 3 ทาง
กินตาย ถูกตาย และไอระเหย
ใช้อัตรา 30 ซีซี. ต่อไร่ 20 ลิตร

การป้องกันกำจัดโรคข้าว อย่างมีประสิทธิภาพ เมล็ดสวย ใบสะอาด



โอมิ
อัตราใช้ 30 ซีซี.

หรือ



เลวิน เอฟ
อัตราใช้ 20 ซีซี.



ซีนอน
อัตราใช้ 20 ซีซี.



ผสมน้ำ
1 หม้อเครื่อง
พ่นให้ทั่ว
พื้นที่ 2 งาน

ควรฉีดพ่น 2 ครั้ง

1. เมื่อข้าวตั้งท้อง (อายุ 65-70 วัน)
2. เมื่อข้าวเริ่มออกรวง (อายุ 75-80 วัน)



โรคใบด่างข้าว



โรคใบจุดสีน้ำตาล



โรคไหม้ใบธง



โรคไหม้คอรวง



โรคดอกกระพี้



โรคใบด่างสีน้ำตาล



เต็มควียน
เร่งเต่ง ออกรวงสม่ำเสมอ
ใช้อัตรา 30 กรัม
ต่อไร่ 20 ลิตร
* ฉีดพ่น 2 ครั้ง
1. ระยะตั้งท้อง-โผล่โผล่ 2. ระยะนํ้านม



โครซิงค์
ทนหนาว ทนแล้ง
แก้ปัญหาคข้าวต้นเหลือง
ราคาต่ำ ไม่กินปุ๋ย
ใช้อัตรา 20 ซีซี. ต่อไร่ 20 ลิตร



บริษัท ฟ็อกซ์ ฟอรัลเลท จำกัด

827 หมู่ 12 ต.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0-2978-6922 แฟกซ์. 0-2978-6928