




ตราฟ็อกซ์

FOX FORMULATE

เทคนิคการผลิตมะม่วงเพื่อการค้า



สารชนิดดูดซึม 48% เติบยาหญ้าหัวคนตา ดูดซึมเร็ว ฆ่าตายนาน



บริษัท ฟ็อกซ์ ฟอรัลเลท จำกัด โทร. 0-2917-4126-7, 0-29786922
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ



เทคนิคการผลิต มะม่วง เพื่อการก้า

หมายเหตุ : ทุกอัตราผสมน้ำ 20 ลิตร



ผลัดใบเขียว น้ำจืด	หัดผลัดใบ สีน้ำตาลเข้ม	บำรุงผล สีจาง	หัดผลัดใบ ใบอ่อน	ช่วงผลิบาน น้ำตาลสีใบอ่อน	เปิดผล	บำรุงผล	บำรุงผล ขยายผล
<ul style="list-style-type: none"> ฉีดปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดปุ๋ย ฉีดฮอร์โมน ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย ฉีดปุ๋ย
 พวรัตน์ อัตรา 30 กรัม	 ดีแอมโมเนียม อัตรา 100 กรัม	 ยูเรีย อัตรา 20-6-6 อัตรา 30 กรัม	 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 10% WP อัตรา 10 กรัม ผสมน้ำ 1 ลิตร	 ยูเรีย อัตรา 0-25-30 อัตรา 30 กรัม	 พวรัตน์ อัตรา 13-0-66 อัตรา 250-300 กรัม	 ยูเรีย อัตรา 20-25-25 อัตรา 30 กรัม	 ยูเรีย อัตรา 14-14-14 อัตรา 30 กรัม
 มิรัน อัตรา 20 กรัม	 มิรัน อัตรา 30 กรัม	 มิรัน อัตรา 25 กรัม (1 ขวด) ผสมน้ำ 200 ลิตร		 มิรัน อัตรา 20 กรัม	 มิรัน อัตรา 50 กรัม	 มิรัน อัตรา 20 กรัม	 มิรัน อัตรา 20 กรัม
พื้ใบเขียว พื้ใบอ่อน	พื้ใบเขียว พื้ใบอ่อน	พื้ใบเขียว พื้ใบอ่อน	พื้ใบเขียว พื้ใบอ่อน	พื้ใบเขียว พื้ใบอ่อน	พื้ใบเขียว พื้ใบอ่อน	พื้ใบเขียว พื้ใบอ่อน	พื้ใบเขียว พื้ใบอ่อน
 มิรัน อัตรา 20 กรัม	 มิรัน อัตรา 30 กรัม	 มิรัน อัตรา 25 กรัม (1 ขวด) ผสมน้ำ 200 ลิตร	 มิรัน อัตรา 10 กรัม ผสมน้ำ 1 ลิตร	 มิรัน อัตรา 20 กรัม	 มิรัน อัตรา 50 กรัม	 มิรัน อัตรา 20 กรัม	 มิรัน อัตรา 20 กรัม



หยุดแอนแทรคโนสเฉียบขาด แน่นนอน สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เลนเต้

ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ (Prochloraz).....45% EC.
กลุ่มสาร : อิมิดาโซล (Imidazole)
คุณสมบัติ : ป้องกันและกำจัดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง



ไม่ใช้สารเลนเต้



ใช้สารเลนเต้



ไม่ใช้สารเลนเต้



ใช้สารเลนเต้

อัตราและวิธีใช้



ระยะเริ่มแทงช่อดอก ถึงดอกบาน

ใช้อัตรา 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน แล้วแต่
ความรุนแรงของโรค



ระยะติดผล

ฉีดพ่นเมื่อผลมะม่วงถึงระยะขบเพาะ
(ประมาณ 30 วันหลังติดผล)
ใช้อัตรา 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน แล้วแต่
ความรุนแรงของโรค

กรณีห่อผล ให้ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนห่อผล 1 วัน



ข้อควรรู้ เลนเต้

แนะนำให้ใช้กับมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้, เชี่ยวเสวย, ฟ้างัน,
โชคอนันต์ มันเดือนเก้า แรด เท่านั้น
ส่วนพันธุ์อื่น ๆ ยังไม่มีข้อมูล



จิบฟ็อกซ์

ขยายขนาดผล จัดทรงให้มะม่วงลูกสวย

ใช้อัตรา 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดหลังดอกบานจนถึง
ลูกเท่าไข่ไก่



กรีนฟ็อกซ์ เอ็ม-7

เป็นสารจับใบคุณภาพสูง
เสริมประสิทธิภาพใช้สารเคมี
ใช้อัตรา 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร



บริษัท ฟ็อกซ์ ฟอรัมูเลท จำกัด

827 หมู่ 12 ต.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0-2917-4126-7, 0-2978-6922