



ตราฟ็อกซ์

# FOX FORMULATE

## เทคนิคการผลิตมะม่วงเพื่อการค้า



สารชนิดออกฤทธิ์ 48% เติบยาหญ้าหัวคนตา ฤดูขมเร็ว หญ้าตายนาน



บริษัท ฟ็อกซ์ ฟอรัลเลท จำกัด โทร. 0-2917-4126-7, 0-29786922  
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ





# หยุดแอนแทรคโนสเฉียบขาด แน่นนอน สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

## เลนเต้

ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ (Prochloraz).....45% EC.  
กลุ่มสาร : อิมิดาโซล (Imidazole)  
คุณสมบัติ : ป้องกันและกำจัดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง



ไม่ใช้สารเลนเต้



ใช้สารเลนเต้



ไม่ใช้สารเลนเต้



ใช้สารเลนเต้

### อัตราและวิธีใช้



#### ระยะเริ่มแทงช่อดอก ถึงดอกบาน

ใช้อัตรา 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน แล้วแต่  
ความรุนแรงของโรค



#### ระยะติดผล

ฉีดพ่นเมื่อผลมะม่วงถึงระยะขบเพาะ  
(ประมาณ 30 วันหลังติดผล)  
ใช้อัตรา 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน แล้วแต่  
ความรุนแรงของโรค

กรณีห่อผล ให้ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนห่อผล 1 วัน



### ข้อควรรู้ เลนเต้

แนะนำให้ใช้กับมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้, เชี่ยวเสวย, ฟ้างัน,  
โชคอนันต์ มันเดือนเก้า แรด เท่านั้น  
ส่วนพันธุ์อื่น ๆ ยังไม่มีข้อมูล



### จิบฟ็อกซ์

ขยายขนาดผล จัดทรงให้มะม่วงลูกสวย

ใช้อัตรา 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดหลังดอกบานจนถึง  
ลูกเท่าไข่ไก่



### กรีนฟ็อกซ์ เอ็ม-7

เป็นสารจับใบคุณภาพสูง  
เสริมประสิทธิภาพใช้สารเคมี  
ใช้อัตรา 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร



บริษัท ฟ็อกซ์ ฟอรัมูเลท จำกัด

827 หมู่ 12 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0-2917-4126-7, 0-2978-6922